



Public Schools | Health Department
Office of School Health

Cheryl Lawrence, MD, FAAP
Medical Director

Август 2019

Office of School Health
30-30 47th Ave.
Long Island City, NY 11101

Уважаемый родитель/опекун!

В требования г. Нью-Йорка к иммунизации на 2025-2026 уч. год внесены изменения. Список обязательных вакцин на 2025-2026 учебный год прилагается к этому письму. Вакцины защищают детей и предотвращают распространение болезней. Вакцинация требуется для посещения школы. Родители детей, посещающих дошкольное учреждение или школу, должны до начала учебного года представить справку о прививках или результаты анализа крови, подтверждающие иммунитет.

Все учащиеся — от дошкольных программ до 12 класса — должны соответствовать требованиям к вакцинации от дифтерии, столбняка и коклюша (DTaP); полиомиелита (IPV или OPV, при этом вакцины OPV, полученные после 1 апреля 2016 г., не учитываются); кори, паротита и краснухи (MMR); ветряной оспы и гепатита В.

Дети в возрасте до 5 лет, зачисленные в программы по уходу и предподготовительные программы (Pre-K), также должны получить прививку от гриппа (до 31 декабря 2025 г., предпочтительно ранней осенью, когда вакцина будет доступна); прививку от гемофильной инфекции (*Haemophilus influenza type b*, Hib) и пневмококковый конъюгат (PCV).

Учащиеся классов 6–12 должны также получить повторную (бустерную) дозу Tdap (дифтерийно-столбнячно-бесклеточной коклюшной вакцины) и MenACWY (менингококковую конъюгатную вакцину).

Принимаются анализы крови, подтверждающие иммунитет к кори, паротиту, краснухе, ветряной оспе и гепатиту В; анализы на иммунитет к полиомиелиту принимаются при условии, что они сделаны до сентября 2019 г. и подтверждают иммунитет ко всем серотипам (1, 2 и 3).

Обсудите иммунизацию ребенка с врачом этим летом. Он объяснит, требуются ли ребенку дополнительные дозы прививок для посещения дошкольного учреждения или школы.

Обратите внимание! Дозы, полученные ребенком ДО достижения минимального возраста, НЕ засчитываются.

С вопросами о требованиях к иммунизации на 2025-2026 учебный год обращайтесь в дошкольное учреждение или школу.

С уважением,

Cheryl Lawrence, M.D., FAAP
медицинский директор
Отдел школьного здравоохранения

Готов ли ребенок к школе или дошкольному учреждению?

2025-2026 учебный год

Городские требования к вакцинации.

Для посещения дошкольного учреждения или школы все проживающие в г. Нью-Йорке дети в возрасте от 2 месяцев до 18 лет должны получить необходимые прививки. Ниже представлены действующие в этом учебном году требования к вакцинации (по учебным уровням). В таблице указано необходимое количество доз, зависящее от возраста ребенка и полученных ранее прививок. При наличии у ребенка определенных заболеваний или в случае досрочной вакцинации (до достижения ребенком определенного возраста) могут потребоваться дополнительные прививки или дозы вакцины. Вакцинация OPV, проведенная до 1 апреля 2016 г., не засчитывается. Принимаются анализы крови, подтверждающие иммунитет к кори, паротиту, краснухе, ветряной оспе и гепатиту В; анализы на иммунитет к полиомиелиту принимаются при условии, что они сделаны до сентября 2019 г. и подтверждают иммунитет ко всем трем серотипам (1, 2 и 3).

Прививки	Программы по уходу, Head Start, ясли, 3-K и Pre-K	Классы К – 5	Классы 6 – 11	12 класс
Вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша (DTaP)	4 дозы	5 доз (или 4 дозы, если четвертая доза получена по достижении 4 лет) или 3 дозы, только для детей в возрасте 7 лет и старше, если первая доза получена в возрасте одного года и старше	3 дозы	
Вакцина против столбняка, дифтерии и коклюша (Tdap) – бустерная доза			1 доза (для детей в возрасте от 11 лет, поступающих в классы 6-12, при условии выполнения иммунизационных требований до достижения 11 лет)	
Вакцина против полиомиелита (IPV или OPV, полученная до 1 апреля 2016 г.)	3 дозы	4 дозы (или 3 дозы, если третья доза получена по достижении 4 лет)		
Вакцина против кори, паротита и краснухи (MMR)	1 доза	2 дозы		
Вакцина против гепатита В	3 дозы	3 дозы	3 дозы (или две дозы вакцины для взрослых Recombivax HB, полученные с интервалом не менее четырех месяцев в возрасте от 11 до 15 лет)	
Вакцина против ветряной оспы	1 доза	2 дозы		
Конъюгированная вакцина от менингококковой инфекции (MenACWY)			6 класс: не применимо Классы 7 – 11: 1 доза	12 класс: 2 дозы (или 1 доза, если первая доза получена по достижении 16 лет)
Конъюгированная вакцина против гемофильной инфекции типа b (Hib)	1 – 4 дозы (в зависимости от возраста, и ранее проведенной вакцинации)			
Конъюгированная вакцина против пневмококковой инфекции (PCV)	1 – 4 дозы (в зависимости от возраста и ранее проведенной вакцинации)			
Вакцина против гриппа	1 доза (вторая доза не обязательна для посещения школы/программы)			

С вопросами обращайтесь к врачу ребенка.
Дополнительная информация — по телефону 311 и на веб-сайте nyc.gov/health
(поиск по ключевым словам **student vaccines**).



Public Schools | Health Department
Office of School Health