



Public Schools | Health Department
Office of School Health

Cheryl Lawrence, доктор медичних наук, член Американської академії педіатрії

Медичний директор

Управління шкільної охорони здоров'я

30-30 47th Ave.

Long Island City, NY 11101

Серпень
2025 року

Шановний батько/мати або
опікун!

У Нью-Йорку оновлено вимоги щодо імунізації учнів шкіл на 2025-2026 навчальний рік. Перелік вимог щодо вакцинації на 2025-2026 навчальний рік додається до цього листа. Вакцини захищають дітей від зараження та поширення хвороб і є обов'язковими для відвідування ними школи. До початку навчального року ви повинні надати підтвердження вакцинації або результати аналізу крові, які підтверджують імунітет вашої дитини, якщо вона відвідує дитячий садок або школу.

Усі учні дитячого садка до 12 класу повинні відповідати вимогам щодо вакцинації проти дифтерії, правця та кашлюка (АКДС); поліовірусу (ІПВ або ОПВ, але ОПВ не враховується, якщо після 1 квітня 2016 року); кору, паротиту та краснухи (КПК); вітряної віспи; та гепатиту В.

Діти віком до 5 років, які навчаються у дитячих садках та дошкільних закладах, також повинні відповідати вимогам щодо вакцинації проти грипу (до 31 грудня 2025 року, але бажано, коли вона стане доступною на початку осені) та вакцини проти *гемофільної палички* типу b (Hib) та кон'югованої пневмококової інфекції (ПКВ).

Діти 6–12 класів також повинні відповідати вимогам щодо ревакцинації проти правця, дифтерії та кашлюку (Tdap) та кон'югованої менінгококової вакцини (MenACWY).

Аналізи крові, які показують імунітет до КПК, вітряної віспи або гепатиту В, також відповідають вимогам (імунітет до поліомієліту прийнятний лише за умови, що лабораторія показує імунітет до всіх серотипів 1, 2, 3 і був проведений до вересня 2019 року).

Приділіть цього літа час, щоб ознайомитися з історією щеплень вашої дитини з її постачальником медичних послуг. Лікар дитини може повідомити вам, чи потрібні додаткові дози однієї або кількох вакцин, щоб ваша дитина могла відвідувати дитячий садок або школу.

Примітка: Якщо дитина отримала дози вакцини до досягнення мінімального віку (занадто рано), ці дози не враховуються в необхідну кількість доз.

Якщо у вас є запитання щодо вимог до вакцинації на 2025-2026 роки, зверніться до дитячого садка або адміністрації школи.

З повагою,

Cheryl Lawrence, доктор медичних наук, член
Американської академії педіатрії
Медичний директор
Управління шкільної охорони здоров'я

Дізнайтеся про обов'язкові щеплення в Нью-Йорку.

Усі учні віком від 2 місяців до 18 років у Нью-Йорку повинні отримати наступні щеплення, щоб відвідувати дитячий садок або школу. Перегляньте потреби дитини у вакцинах залежно від її класу цього навчального року. У графіку щеплень нижче показано кількість необхідних дійсних доз. Кількість доз вакцини, необхідна вашій дитині, може змінюватися залежно від її віку та попередніх отриманих доз вакцини. Вашій дитині можуть знадобитися додаткові вакцини або дози вакцини, якщо у неї є певні захворювання або попередні дози були введені занадто рано (недійсні); ОПВ не враховується, якщо після 1 квітня 2016 року. Аналізи крові, які показують імунітет до кору, паротиту та краснухи, вітряної віспи або гепатиту В, також відповідають вимогам (імунітет до поліомієліту прийнятний лише в тому випадку, якщо лабораторний тест показує імунітет до всіх 3 серотипів 1, 2, 3 і був проведений до вересня 2019 року).

Щеплення	Заклад з догляду за дітьми, центр ранішнього розвитку, Ясла, 3 клас-дитячий садок або дошкільний заклад	Від дитячого садка до 5 класу	6-11 класи	12 клас
Дифтерія, правець та кашлюк (АКДС)	Чотири дози	П'ять доз (або чотири дози, тільки якщо четверту дозу було отримано у віці 4 років або старше, або три дози, тільки якщо дитині 7 років або старше, а серію вакцинації розпочали у віці 1 року або старше)	Три дози	
Бустерна вакцинація проти правця, дифтерії та кашлюку (Tdap)			Одна доза (обов'язкова у віці 11 років або старше при вступі до 6–12 класів та з дотриманням вимог до 11 років)	
Поліомієліт (ІПВ або ОПВ, якщо до 1 квітня 2016 року)	Три дози	Чотири дози (або три дози, якщо третя доза була отримана у віці 4 років або старше)		
Кір, паротит та краснуха (КПК)	Одна доза	Дві дози		
Гепатит В	Три дози	Три дози	Три дози (або дві дози вакцини проти гепатиту В для дорослих, Рекомбивакс НВ, якщо дози були отримані з інтервалом щонайменше чотири місяці між 11 та 15 роками)	
Вітряна віспа (вітрянка)	Одна доза	Дві дози		
Кон'югат менінгококу (MenACWY)			6 клас: Не застосовується. 7–11 класи: Одна доза	12 клас: Дві дози (або одна доза, якщо перша доза була отримала до 16 років або старше)
Кон'югат проти гемофільної інфекції типу b (Hib)	Від однієї до чотирьох доз (залежно від віку дитини та доз, які вона отримувала раніше)			
Конюгат проти пневмококової інфекції (PCV)	Від однієї до чотирьох доз (залежно від віку дитини та доз, які вона отримувала раніше)			
Інфлуенца (грип)	Одна доза (друга доза, якщо потрібна, не потрібна для відвідування)			

Якщо у вас є якісь питання, зверніться до постачальника медичних послуг дитини.
Для отримання додаткової інформації, зателефонуйте за номером **311** або відвідайте веб-сайт: **nyc.gov/health** та знайдіть інформацію про **вакцини для учнів**.



Public Schools

Health Department

Office of School Health